

会 告 (3)

日本看護研究学会雑誌35巻4号掲載を下記の通り訂正いたします。

P15 表 1

誤

表 1 FTDの臨床症状と自閉症臨床症状の診断類似点

| FTDの臨床症状 | 自閉症臨床症状 |
|---|---|
| The Lund and Manchester Groups (1994). Clinical and neuropathological criteria for frontotemporal dementia. <i>J Neurol Neurosurg Psychiatry</i> , 57, 416-418. より抜粋引用 | DSM-IVより, 類似項目を記載 |
| 1) 行動障害 <ul style="list-style-type: none"> ● 潜行性の症状と緩徐な進行 ● 早期からの自己に対する関心の喪失 (自己の衛生や身なりの無視) ● 早期からの社会に対する関心の喪失 (社会性の喪失, 万引きなどの軽犯罪) ● 早期からの脱抑制症候 (抑制の効かない性衝動, 暴力行為, 場にそぐわないふざけなど) ● 精神の硬直化と柔軟性のなさ ● 口唇傾向 (食嗜好の変化, 過食など) ● 常同行動と保持的行動 (周遊行動, 型にはまった行動, 収集, 身支度への儀式的没頭) ● 使用行動 (周囲にある道具への抑制のきかない探究) ● 注意緩慢, 衝動性, 維持困難 ● 早期からの病識の欠如 (自己の変化を客観的に見ることができない) | 1) a) b) c) d) 3) a) 3) a) b) c) 1) a) b) c) d) 3) a) b) c) 3) a) |
| 2) 感情障害 <ul style="list-style-type: none"> ● 抑うつ, 不安, 過度の感傷, 希死念慮, 執着観念, 妄想, 心気症, <u>奇妙な自己身体への執着</u>: これらは早期にみられ, 消えやすい ● 感情面での無頓着さ (無関心, 共感の欠如など), 無表情 (不活発, 自発性低下) | 3) a) b) c) 1) a) b) c) d) |

正

表 1 FTDの臨床症状と自閉症臨床症状の診断類似点

| FTDの臨床症状 | 自閉症臨床症状 |
|---|---|
| The Lund and Manchester Groups (1994). Clinical and neuropathological criteria for frontotemporal dementia. <i>J Neurol Neurosurg Psychiatry</i> , 57, 416-418. より抜粋引用 | DSM-IVより, 類似項目を記載 |
| 1) 行動障害 <ul style="list-style-type: none"> ● 潜行性の症状と緩徐な進行 ● 早期からの自己に対する関心の喪失 (自己の衛生や身なりの無視) ● 早期からの社会に対する関心の喪失 (社会性の喪失, 万引きなどの軽犯罪) ● 早期からの脱抑制症候 (抑制の効かない性衝動, 暴力行為, 場にそぐわないふざけなど) ● 精神の硬直化と柔軟性のなさ ● 口唇傾向 (食嗜好の変化, 過食など) ● 常同行動と保持的行動 (周遊行動, 型にはまった行動, 収集, 身支度への儀式的没頭) ● 使用行動 (周囲にある道具への抑制のきかない探究) ● 注意緩慢, 衝動性, 維持困難 ● 早期からの病識の欠如 (自己の変化を客観的に見ることができない) | 1) a) b) c) d) 3) a) 3) a) b) c) 1) a) b) c) d) 3) a) b) c) 3) a) |
| 2) 感情障害 <ul style="list-style-type: none"> ● 抑うつ, 不安, 過度の感傷, 希死念慮, 執着観念, 妄想, 心気症, <u>奇妙な自己身体への執着</u>: これらは早期にみられ, 消えやすい ● 感情面での無頓着さ (無関心, 共感の欠如など), 無表情 (不活発, 自発性低下) | 3) a) b) c) 1) a) b) c) d) |